

Інформація для пацієнтів.

Будь ласка, уважно прочитайте інформаційний листок - вкладиш в упаковці, так як він містить важливу інформацію.

Даний препарат був призначений Вам лікарем або стоматологом, або ж Ви самостійно придбали його в аптеці або магазині без рецепта лікаря. Використовуйте препарат згідно з інформаційним листком - вкладишем в упаковці згідно з призначенням лікаря, стоматолога, фармацевта або консультанта магазину, щоб отримати найбільшу користь від нього. Зберігайте інформаційний листок - вкладиш, можливо, Ви захочете прочитати його ще раз.

Гель Paro Amin-Fluorid

Що являє собою Гель Paro Amin-Fluorid і коли він застосовується?

Гель Paro Amin-Fluorid являє собою концентрат для локального фторування зубної емалі і посилення протистояння виникненню карієсу. Гель Paro Amin-Fluorid містить амінофторид, який перешкоджає виникненню карієсу, наноситься на поверхню зубів і за своїм змістом є більш концентрованим, ніж зубна паста. Внаслідок цього він використовується не щодня, а раз на тиждень. Цей періодичний ефект фторування підтримується або посилюється в ході щоденного чищення зубів з використанням зубної пасти.

У яких випадках не можна використовувати Гель Paro Amin-Fluorid?

Гель Paro Amin-Fluorid не можна використовувати для дітей молодше 6 років, тому що у них ще сильно виражений ковтальний рефлекс. Гель Paro Amin-Fluorid не можна також використовувати при підвищеній індивідуальній чутливості до даного препарату або його компонентів.

Коли при використанні Геля Paro Amin-Fluorid необхідна обережність?

У випадку, якщо у Вас неконтрольований ковтальний рефлекс, гель необхідно застосовувати з обережністю.

Пацієнтам, які мають підвищену індивідуальну чутливість до азобарвників, ацетилсаліцилової кислоти, протиревматичних і знеболюючих засобів (інгібіторів простагландину), не варто використовувати Гель Paro Amin-Fluorid.

Повідомте Вашого лікаря, стоматолога, фармацевта або консультанта в магазині, якщо Ви

- страждаєте іншими захворюваннями
- страждаєте від алергії
- приймаєте або застосовуєте інші лікарські засоби (навіть куплені без призначення лікаря!)

Чи можна використовувати Гель Paro Amin-Fluorid під час вагітності або в період грудного вигодовування?

На підставі до теперішнього часу наявного досвіду використання препарату за призначенням, ризики для дитини виключено. Але систематичні наукові дослідження ніколи не проводилися. З метою обережності по можливості утримайтеся від використання препарату під час вагітності та в період годування груддю, або зверніться за порадою до лікаря, стоматолога, фармацевта або консультанта магазину.

Як потрібно використовувати Гель Paro Amin-Fluorid?

Під час догляду за зубами вдома:

Дорослим і дітям від 6 років: якщо не призначено іншого, один раз на тиждень ретельно чистити зуби 1 - 2 хвилини з використанням Геля Paro Amin-Fluorid. Після закінчення чищення сплюнути, але не полоскати. Діти під час чистки не повинні ковтати, а після чистки трохи сполоснути ротову порожнину. Діти молодше 8 років повинні чистити зуби під наглядом дорослих.

Дотримуйтесь дозування, зазначеного в інформаційному аркуші-вкладиші, або прописаного лікарем чи стоматологом. Якщо Вам здається, що препарат має дуже слабкий, або, навпаки, сильний вплив, зверніться до Вашого лікаря, стоматолога, фармацевта або консультанта магазину.

У школі:

Гель Paro Amin-Fluorid підходить для використання в школі в ході організованого догляду за зубами в якості засобу для фторування. Частота використання залежить від організаційних можливостей і повинна здійснюватися 2 - 4 рази на місяць.

У стоматологічній та клінічній практиці:

Гель Paro Amin-Fluorid як засіб для покриття наноситься за допомогою ватного тампона або обертаємої щітки. Особливо ефективного та тривалого ефекту можна досягти при використанні препарату за допомогою пластикової міні-капи або ложечки спеціальної форми. При високій активності карієсу, дітям старше 8 років рекомендується залишати невеликі залишки гелю в щілинах і міжзубних просторах.

Які побічні явища може викликати Гель Paro Amin-Fluorid?

При використанні Геля Paro Amin-Fluorid можуть виникнути наступні побічні явища:

Може виникнути реакція підвищеної індивідуальної чутливості шкіри та органів дихання, особливо у пацієнтів, що страждають астмою, кропив'яною лихоманкою (хронічна Urticaria) або підвищеною індивідуальною чутливістю до ацетилсаліцилової кислоти та інших протиревматичних і знеболюючих засобів.

Якщо Ви помітили інші побічні дії, не описані в даному інформаційному листку-вкладиші, повідомте про них свого лікаря, стоматолога, фармацевта або консультанта магазину.

На що ще потрібно звернути увагу?

Гель Paro Amin-Fluorid зберігається в закритій ємності при кімнатній температурі (15 - 25° C) у сухому, недоступному для дітей місці.

Препарат потрібно використовувати тільки до означеної дати закінчення терміну придатності.

Іншу інформацію Ви можете отримати у Вашого лікаря, стоматолога, фармацевта або консультанта магазину.

Що містить Гель Paro Amin-Fluorid?

Фторид натрію 2,54% (соотв. 1,15% фториду). Олафлур/дектафлур 1,33% (соотв. 0, 10% фториду), ароматичні речовини, ванілін, сахарин, барвник: cochénillerot (E 124), а також інші допоміжні речовини (Смак суниці)

Де можна придбати Гель Paro Amin-Fluorid і які упаковки є у продажу?

В аптеках і магазинах з продажу косметичних товарів і засобів гігієни, без рецепта лікаря.

Доступні упаковки:

- Тюбик 25 гр., розрахований приблизно на 35 використань.
- Флакон 200 мл., для клінік, лікарень і шкіл.